

INFORMACION DE CONSENTIMIENTO
PROCEDMIENTOS PERIODONTALES, DETARTRAJE Y ALISADO RADICULAR

YO ENTIENDO QUE LOS PROCEDIMIENTOS PERIODONTALES (tratamientos que involucran la encia y otros tejidos que soportan los dientes) incluye riesgos y posibles resultados sin éxito de tal tratamiento.

Aunque el maximo cuidado y diligencia es ejecutado en el tratamiento de la enfermedad periodontal y condiciones asociadas durante el detartraje y alisado radicular estan relacionadas al procedimiento, no hay promesas o garantias que le anticipen el resultado. Estoy de acuerdo en asumir los riesgos y posibles resultados no exitosos asociados con el trataminento pero no limitados a los siguiente:

1. **Respuesta del tratamiento:** Debido a muchas variables de cada paciente fisiologicamente unicas, es imposible determinar con presicion el proceso de cicatrizacion en la cual la respuesta del tejido es un elemento vital para alcanzar los resultados deseados por el odontologo, la higienista asi como para el paciente. En caso de que los resultados no sean optimos la extraccion de los dientes puede ser requerida a pesar de los esfuerzos por salvarlos.
2. **Responsabilidad del paciente en el cuidado pos-operatorio:** Dentro de los tipos de tratamientos requeridos para corregir la enfermedad periodontal, es mandatorio que el paciente sea extremadamente diligente realizando su higiene oral despues del tratamiento y sera instruido por el Odontologo o la higienista. Sin el cuidado necesario por parte del paciente la probabilidad de un resultado no satisfactorio se incrementa.
3. **Dolor, adolorido y sensibilidad:** Puede haber incomodidad post-operatoria temporal o permanente relacionada a los estímulos de frio y calor, al contacto del diente con el azucar o comidas acidas. Generalmente la encia va ha estar adolorida despues del tratamiento.
4. **Sangrado durante o despues del tratamiento:** Laceraciones o rasgamientos de la encia pueden acurrir, lo cual requerira suturarla.
La encia puede tambien sangrar despues del tratamiento. Si sangra demasiado debe llamar a su Odontologo.
5. **Retraccion de la encia despues del tratamiento:** Despues de que ocurre la cicatrizacion puede haber retraccion la cual expone el margen de las coronas o rellenos, incrementando la sensibilidad de los dientes y causando un cambio en la estetica en los dientes frontales lo que puede hacer parecer los dientes mas largos y anchos debido a que los espacios entre los dientes se hacen mas visibles. Este espacio entre los dientes sirve para alojar comida y sera necesario remplazar las coronas o los puentes como resultado de la retraccion de la encia.
6. **Curetas rotas, raspadores u otros instrumentos e infeccion post-operatoria:** Podria ser necesario recuperar instrumentos rotos quirurgicamente, aunque se trata de tener el mayor cuidado para evitar estos incidentes. Infecciones post-operatoria pueden ser tambien resultado de calculos atrapados en la encia que pueden requerir una intervencion quirurgica.
Raramente instrumentos usados en procedimientos periodontales pueden entrar al ojo y causar dano temporal o permanente.
7. **Aumento de la movilidad de los dientes** durante el periodo de cicatrizacion puede esperarse en muchos casos.
8. **Ruido y salpicado del agua.** Los instrumentos de ultrasonido son ruidosos y el agua usada puede causar sensibilidad al frio en los dientes no anesteciados en el area a tratar.
9. **Complicaciones post-operatorias:** Agrietamientos por estiramiento de los labios / esquinas de la boca durante el tratamiento pueden ocurrir. Hay la posibilidad a que un tratamiento quirurgico sea necesario despues del alisado radicular.
10. **Secuela del medicamento local:** Si una fibra de Tetraciclina es usada, puede haber una perdida prematura de la fibra haciendo necesario una segunda cita para reemplazarla. Puede haber adolorimiento o dolor en las areas tratadas. El paciente puede sentir los adhesivos/sellador que quedan superficiales. El sellante tiene una apariencia opaca lechosa y se puede ver. Puede ser necesario una visita post-operatoria para remover las fibras de 7 a 10 dias despues del procedimiento. Pueden haber reacciones alergicas o adversas al antibiotico en la fibra, sin embargo, es importante que el paciente notifique al Odontologo previamente de posibles alergias a los antibioticos especialmete a la Tetraciclina.
11. **Riesgos a los Bisfosfonatos:** Para los pacientes que estan tomando medicamentos como el Fosamax, Actonel, Boniva o cualquier otro medicamento ordenado para reducir la reabsorcion de los huesos, como la Osteoporosis o para tratamientos de metastasis en cancer de hueso hay un aumento en el rieazgo de la necrosis de hueso o un fracaso en el proceso de cicatrizacion del hueso seguido al tratamiento de cirugia periodontal que involucre el hueso, incluyendo remodelacion etc. Ademas de posibles demoras en la cicatrizacion despues del detartraje y alisado radicular.

CONSENTIMIENTO DE LA INFORMACION: He tenido la oportunidad de hacer cualquier pregunta con respecto a la naturaleza y el proposito del tratamiento periodontal y he recibido respuestas satisfactorias. Voluntariamente asumo cualquiera y todos los posibles riesgos incluyendo el riesgo de danos, si alguno estuviera asociado con cualquier fase de este tratamiento en esperanza de obtener los resultados deseados los cuales pueden o no ser alcanzados. No promesas o garantias me han sido dadas con respecto a la recuperacion y resultados del tratamiento. Los honorarios por este servicio se me han sido explicados y son satisfactorios. Al firmar este consentimiento estoy dando mi permiso y autorizo al Dr _____ y/o sus asociados a hacer el tratamiento necesario o conveniente a mis condiciones dentales incluyendo cualquiera o todas las anestecias y/o medicamentos.

Nombre del paciente

Firma del paciente o
Representante Legal

Fecha